



Adjuvants THD pour les maladies colorectales


La gamme complète pour une solution efficace

MALADIE HÉMORROÏDAIRE

La maladie hémorroïdaire est l'une des manifestations les plus fréquentes de l'insuffisance veineuse touchant le plexus hémorroïdaire.

En effet, une mauvaise circulation sanguine entraîne une stase veineuse, ce qui déclenche des processus inflammatoires locaux, tels que l'œdème et l'affaiblissement progressif des vaisseaux périphériques.

Une maladie hémorroïdaire se manifeste par les symptômes fréquents suivants : prurit, brûlures, douleur et saignements.



THDCREAM

Adjuvant pour le traitement des hémorroïdes



INGRÉDIENTS : Aqua, hamamelis virginiana leaf water, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil, helianthus annuus seed oil, phenoxyethanol, panthenol, phospholipids, polysorbate 60, sorbitan isostearate, boswellia serrata resin extract, microcrystalline cellulose, ethylhexylglycerin, escin, tocopherol, sodium carboxymethyl beta-glucan, trisodium ethylenediamine disuccinate, beta-sitosterol, ruscus aculeatus root extract, silica, sodium hydroxide.

CONDITIONNEMENT : Tube avec applicateur rectal.

POSOLOGIE : Il est recommandé d'effectuer une application par jour, de préférence après l'évacuation des selles. Il est recommandé de ne pas dépasser une utilisation ininterrompue au-delà de 30 jours.


Ne contient pas de cortisone, anesthésique local ou colorants. Nickel Tested.

FISSURES ANALES

Les fissures anales sont la deuxième cause de visite chez un proctologue seulement dépassée par la maladie hémorroïdaire.

Cette condition est fréquente sur toute les tranches d'âges, mais surtout entre 20 et 40 ans.

Physiopathologie : une hypertonie persistante dans le sphincter anal interne causée par la constipation, la douleur, le stress, une ischémie locale.



LEVORAG

Adjuvant pour le traitement des fissures anales



INGRÉDIENTS : Aqua, dimethicone, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil, phenyl trimethicone, borago officinalis seed oil, malva sylvestris extract, panthenol, dextrin, hydrolyzed hibiscus esculentus extract, phenoxyethanol, glyceryl stearate, cetyl alcohol, PEG- 75 stearate, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, triethanolamine, tocopherol, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, calendula officinalis extract, maltodextrin, glycyrrhiza glabra extract, ceteth-20, steareth-20, ethylhexylglycerin, sodium carboxymethyl beta-glucan, trisodium ethylenediamine disuccinate, tropolone, aspartic acid, sodium chloride, sodium bromide.

CONDITIONNEMENT : 20 tubes monodoses de 3,5 ml.

POSOLOGIE : Appliquer deux fois par jour, pendant au moins 20 jours consécutifs, de préférence le matin ou le soir, si possible après l'évacuation des selles.

Ne contient pas de cortisone, lidocaïne, parfum ou colorants. Nickel Tested.

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Prospective multicentre observational trial on the safety and efficacy of LEVORAG® Emulgel in the treatment of acute and chronic anal fissure - Altomare D.F., Digennaro R., Pecorella G., Serra G., et al.

Topical application of Levorag as first line treatment for chronic anal fissures: a preliminary multicentre study - Giordano P., Mistrangelo M., Cracco N., D'Elia A., et al.


INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE (IVC)

- IVC, un problème avec une incidence élevée⁽¹⁾
- Concerne majoritairement les femmes
- Touchant 50-55 % des femmes italiennes

La stase sanguine déclenche des processus inflammatoires locaux entraînant un œdème et un affaiblissement progressif des vaisseaux veineux périphériques.

Par conséquent, l'inflammation et l'affaiblissement des parois veineuses périphériques sont des éléments clés de l'insuffisance veineuse chronique.

⁽¹⁾ Étude sur l'épidémiologie et la prévalence de la maladie veineuse chronique de la Société italienne d'angiologie et de médecine vasculaire - SIAPAV



THDFLEBENTM 1000

Complément alimentaire à haute teneur en bioflavonoïdes



INGRÉDIENTS : Eau, fructose, glycérol, diosmine, rutine, quercétine, hespéridine, arômes, stabilisants: polysorbate 80, esters de saccharose d'acides gras; conservants: sorbate de potassium; acidifiant: acide citrique; épaississant: gomme xanthane; édulcorant: sucralose.

CONDITIONNEMENT : 10 flacons monodose de 15 ml - Goût d'agrumes.


POSOLOGIE : Il est recommandé de prendre 1 flacon par jour.

Sans gluten et sans lactose. Sans saccharose et OGM.


ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Flavonoid mixture in the treatment of I–III degree hemorrhoidal disease: a double-blind multicentre prospective comparative study
Corsale I., Carrieri P. et al.

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE (IVC)



Shunt artérioveineux



Plexus hémorroïdaire

THDFLEBEN

Complément alimentaire : Diosmin et Melilot



INGRÉDIENTS : Diosmin, Agent gonflant : Dicalcium de phosphate; Mélilot (*Melilotus officinalis* Pallas, maltodextrine) extrait sec d'herba cum floribus titré. 20 % de coumarine, Agents d'enrobage : Alcool polyvinylique, talc, polyéthylèneglycol, polysorbate 80 ; Anti-agglomérants : carboxyméthylcellulose sodique réticulée, sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium ; Colorants : E132, E171, E172.


CONDITIONNEMENT : 20 comprimés de 1000 mg.

POSOLOGIE : La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour, de préférence à jeun.

ALTÉRATIONS INTESTINALES

Les altérations intestinales sont caractérisées par des fonctions d'absorption et de transit irrégulières et se manifestent par une activité intestinale anormale telle que diarrhée, constipation prolongée, obstruction intestinale, incontinence fécale.

Quelles que soient les causes organiques et fonctionnelles, il est essentiel de maintenir l'eubiose intestinale avec un régime alimentaire quotidien adapté ou en prenant des suppléments de fibres alimentaires, en particulier de fibres solubles.



THDFIBRAID™ Gel

Complément alimentaire extrait de fibres et de légumes



INGRÉDIENTS : Eau purifiée, fibres alimentaires solubles (maltodextrine), fructose, psyllium (Plantago ovata Forssk) de poudre à cuticule, anis vert (Pimpinella anisum L., maltodextrine de maïs, E551) d'extrait de fruits secs, arôme, acidifi ant: acide citrique, Conservateurs: sorbate de potassium et benzoate de sodium.

CONDITIONNEMENT : 20 sticks monodoses de 10 ml chacun - Goût ACE.


POSOLOGIE : Il est recommandé de prendre 2 stick-packs par jour.

Sans gluten et lactose. Sans sucrose et OGM.

ALTÉRATIONS INTESTINALES



Plantago Psyllium



Côlon

THDFIBRAID™

Complément alimentaire en poudre à haute teneur en fibres et en zinc



INGRÉDIENTS : Psilliopect: mélange de fibres constituées de la peau des graines de psyllium (*Plantago ovata* Forssk.) poudre tit. 98%, fructooligosaccharides, inuline de Chicorée (*Cichorium intybus* L.), saccharose, arômes, agent acidifiant: acide citrique; pectine de pomme, agent anti-agglomérant: dioxyde de silicium; gluconate de zinc, édulcorants: acésulfame K, sucralose; colorants: E101a (riboflavine-5'-phosphate sodique), E120 (cochenille).

CONDITIONNEMENT : 20 sachets de 8 g chacun - Goût orange.

POSOLOGIE : Il est conseillé de prendre deux sachets par jour dissous dans environ 200 ml d'eau.

Il peut contenir de la moutarde et du sésame. Ne contient pas: Gluten et Lactose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THDCREAM

Référence	THD830022
Conditionnement	Tube avec applicateur rectal
Posologie	Il est recommandé d'effectuer une application par jour



LEVORAG

Référence	THD830011
Conditionnement	20 tubes monodoses de 3,5 ml
Posologie	Appliquer deux fois par jour



THDFLEBENTM₁₀₀₀

Référence	THD830018
Conditionnement	10 flacons monodose de 15 ml - Goût d'agrumes
Posologie	Il est recommandé de prendre 1 flacon par jour



THDFLEBEN

Référence	THD830005
Conditionnement	20 comprimés de 1000 mg
Posologie	La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour



THDFIBRAIDTM_{Gel}

Référence	THD830001
Conditionnement	20 sticks monodoses de 10 ml chacun - Goût ACE
Posologie	Il est recommandé de prendre 2 stick-packs par jour



THDFIBRAIDTM

Référence	THD830003
Conditionnement	20 sachets de 8 g chacun - Goût orange
Posologie	Il est conseillé de prendre 2 sachets par jour



DELICLIN[®]_{Soap}

Référence	THD830014
Conditionnement	200 ml

